

HCG注射は 月 日 22時 0分に

本院の末広町大川産婦人科病院 3階の病棟で行います。

10分前に1階玄関前のインターホンを押してください

採卵は 月 日 8時50分来院(高砂町)

9時30分～10時に採卵予定 帰宅は約13時頃

採卵前日は 23 時より絶飲食です。間違っで飲食されますと、麻酔時に嘔吐し、吐物を誤嚥する危険性がありますのでご注意ください。

以下に採卵当日の流れを説明いたします。

1. 採卵当日は化粧・マニキュア・アクセサリ等はされないで、署名済みの各同意書と麻酔問診票をお持ちになり、8時50分までに来院されてください。ご自分でお車を運転なさらなようにしてください。
2. 体外受精の費用前払い金額は ¥300,000 円 を受付でお支払いください。
3. 待合室でお待ちください。培養士か看護師が精液（1時間以内の自宅採精）を受け取りに参ります。
4. 排尿を済ませた後、外来診察室で診察と膣洗浄があります。この時、卵胞の数、子宮内膜の厚さを診察します。
5. 診察後、回復室へご案内いたします。当院の寝衣に着替えてお待ちください。
6. 時間になりましたら、手術室へスタッフがご案内いたします。
7. 手術室で点滴を始め、麻酔下に採卵を行います。
8. 採卵が終わり、麻酔から醒めてきましたら回復室へ移動します。
9. 採卵から約2時間後に、再度、外来診察室で診察があり、帰宅の許可が出ます。
- 10.最後に、看護師から注意事項（採卵が終わった方への説明書）等の説明があります。受付でホルモン剤（膣坐薬、内服）と抗生剤、鎮痛剤をお受け取りください。
- 11.おひとりではお帰りにならないようにしてください。おひとりで帰宅される方は事前にスタッフにご相談ください。

緊急時連絡先

*平日 9:00～18:00の間は、大川産婦人科・高砂 Tel 097-532-1135 へ

*休日と平日の 18:00～9:00の間は、大川産婦人科病院・末広 Tel 097-536-3511 へ

1. 本日は帰宅後もおゆっくりお過ごしください。入浴（できればシャワー浴）は翌日からにしてください。ご気分が悪い、お腹が痛いなど、何か症状がありましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
2. 採卵日の夕方より 3 日間プロゲステロン膣座薬挿入(朝夕各 1 錠)、プラノバル 1T/日内服。(胚移植後更に各 14 日間追加)
ホルモン剤(内服) : プラノバル 1 日 1 錠 3 日分
ホルモン剤(膣座薬) : プロゲステロン膣座薬 1 日 2 回 朝、眠前各 1 錠膣内挿入3日分
抗生剤 : メイアクト 1 日 3 錠 (食後) 2 日分
鎮痛剤 : ロキソニン 1 錠 イサロン 1 錠 屯用 (痛いとき) 3 回分
3. 翌朝、受精を確認しますので、その結果をお知りになりたい方は、 月 日の 11 時にお電話ください。

緊急時連絡先

* 平日 9:00 ~ 18:00 の間は、大川産婦人科・高砂 Tel 097-532-1135 へ

* 休日と平日の 18:00 ~ 9:00 の間は、大川産婦人科病院・末広 Tel 097-536-3511 へ

胚移植日が決まった方へ

大川産婦人科・高砂 2011,01,01 B5

胚移植日

月 日の午前9時30分に来院

1. 来院の前日からの絶食は必要ありません。当日は来院の2時間前に最後の排尿をされて来院してください。お車を運転されてもかまいません。
2. 外来診察室での診察所見と胚培養の所見より胚移植可能かどうかを確認していただきます。
3. 胚移植できる場合、着替えて無麻酔で行います。施行後約1時間はベッド上で安静にしていただきます。
4. 胚移植できない場合、今回の状況、今後の治療についての説明を致します。
例：胚移植日に **OHSS** の発症が予測され、あるいは子宮内膜の厚さ不十分の場合には、胚移植を行わずに全ての受精卵を凍結すること（全胚凍結）をお勧めする場合があります。胚凍結を行う場合、担当者から凍結卵の取り扱いに関する説明を致します。
5. 妊娠判定日（胚移植後約2週間後來院診察と説明）まで、プロゲステロン膣坐薬1日2回挿入、プラノバル1日1錠内服を継続してください。
6. 妊娠判定前に少量の出血を認める場合でも妊娠している可能性があります。内服、坐薬は中止することのないようにお願いします。ただし明らかに生理と思われる多量の出血を認めた場合は、診察した上で投薬を継続するかどうか決定いたします。

緊急時連絡先

*平日 9:00～18:00の間は、大川産婦人科・高砂 Tel 097-532-1135 へ

*休日と平日の18:00～9:00の間は、大川産婦人科病院・末広 Tel 097-536-3511 へ

1. 採卵後からホルモン内服剤とプロゲステロン膣坐薬（着床を助けるための薬）を14日間追加しますので、必ず続けてください。
2. 本日はごく少量の出血を認めることがありますが、ご心配なさらないでください。
3. 本日帰宅後、ゆっくり過ごしてください。入浴（できればシャワー浴）されてもかまいません。明日からは普段の生活・仕事をされてかまいません。
4. 卵がたくさん採れた方は、お腹が張ってくることがあります（OHSS 卵巣過剰刺激症候群という病態です）ので、以下の症状が強い場合はご連絡ください。
OHSS の症状：腹部膨満、腹痛腰痛、吐き気、尿量減少（乏尿）、息苦しさ
5. アルコール・タバコは禁止です。
6. 胚移植して約2週間後に妊娠判定をしますので、 月 日にご来院ください。